

CAMPAGNA DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE

Si informa la popolazione che per la lotta contro le zanzare bisogna adottare alcune precauzioni indispensabili per limitare la densità di popolazione nell'area in cui si vive.

Per comprendere meglio l'importanza di queste presentiamo di seguito il ciclo delle specie presenti nel nostro territorio e cioè quelli appartenenti all'Ordine dei Ditteri, Famiglia dei Culicidi e al genere Anopheles, Aedes e Culex.

Il ciclo è uovo - larva - pupa - adulto

Le femmine depongono le uova in **acqua, in una qualsiasi raccolta, sia chiara che sporca, piovana che di fogna**. Nascono subito le larve le quali rimangono **in acqua** nutrendosi di minuscolo materiale animale e vegetale. **In estate, con le alte temperature, bastano solo alcuni giorni per le larve a svilupparsi, a raggiungere lo stadio di pupa e di adulto**. L'adulto ha apparato boccale pungente - succhiante; con dimorfismo sessuale: i maschi sono provvisti di grande antenne piumate, mentre le femmine le hanno fornite di brevi peli. **I primi sono glicifagi** cioè si nutrono di sostanze zuccherine, vari succhi vegetali e occasionalmente liquidi derivanti dalla decomposizione di animali morti, **invece le femmine sono ematogaghe temporanee**, hanno bisogno di succhiare sangue che è l'alimento indispensabile per portare a termine la maturazione dell'uova. **Frequentano località abitate ed hanno, in genere, costumi crepuscolari e notturni e non si allontanano molto dalle località ove sono nati.**

PRECAUZIONI DA PRENDERE

- Rimozione o trattamento di qualsiasi ristagno idrico e cause relative (pozzanghere, strati impermeabili nel terreno, invasi, etc.);
- Chiudere tutte le cavità sui muri e sugli alberi;
- Capovolgere o rimuovere o chiudere/sigillare qualsiasi contenitore esterno che trattenga acqua, quali bacinelle, pentole, vasi, pneumatici per auto, teli di copertura di cumuli di materiali e legna;
- Manutenzione periodica delle caditoie, griglie di raccolta e tombini fognari per una loro continua funzionalità;
- Cambiare l'acqua dei sottovasi ogni 2-3 giorni e tenere pulite le ciotole per l'acqua degli animali domestici
- Evitare di accatastare materiale negli ingressi degli abitati perché gli adulti trovano riparo e possono facilmente attaccare ed entrare in casa e quindi taglio dell'erba e della vegetazione infestante.